

Prægravide risikofaktorer mm

DD685	Trombofili	Som giver anledning til medicinsk profylakse i graviditeten
DE66	Fedme/adipositas	Som indikation for intervention f.eks. glucose-belastning, igengsættelse etc. Skal ikke kodes som komplicerende medicinsk sygdom.
DF102	Alkoholafhængighed	
DF112	Narkomani	
DN969	Abortus habitualis	
DZ225	Bærer af Hepatitis B virus antigen	
DZ226	HIV positiv moder	
DZ317	Præconceptionel rådgivning	
DZ352	Tidligere perinatalt dødsfald	
DZ355	Alder >= 40 år	Som indikation for f.eks igangsættelse .(Ny kode uden paritet er på vej)
DZ358D	Tidligere traumatisk graviditet/fødsel/udfald	Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel
DZ358E	Tidligere sectio	Alle som har fået foretaget kejsersnit tidligere. Hvis det tidligere kejsersnit er en indikation for nyt kejsersnit skal det også kodes som DO342
DZ358F	Graviditet efter IVF	
DZ358H	Graviditet efter hormonstimulation	
DZ358J	Mindre liv	
DZ358K	Graviditet efter ægdonation	Fra 01.01.12
DZ358L	Fald eller traume under graviditet	
DZ875A	Anamnese med cervixinsufficiens	
DZ875B	Tidligere anlagt abdominal cerclage	
DZ875C	Tidligere sphincterruptur	
DZ907D	Følger efter omskæring	
DZ928C	Tidligere koniseret	
DZ980C	Tilstand med "Gastric bypass"	

Infektionssygdomme i graviditet

DO988	Infektionssygdomme i graviditet f.eks. DB019 Skoldkopper f.eks. DB259 CMV f.eks. DB343 Parvovirus f.eks. DB589 Toxoplasmose f.eks. DA32 Listeriose f.eks. DA600 Herpes genitalis	
-------	--	--

Komplicerende medicinske sygdomme

DO991A	Hæmatologiske sygdomme f.eks. DD696 Thrombocytopeni	Eksklusive anæmi som ikke skyldes medicinsk sygdom
DO992A	Endokrinologiske sygdomme f.eks. DE039 Hypothyreoidisme f.eks. DE059 Hyperthyreoidisme	
DO993A	Neurologiske sygdomme f.eks. DG409 Epilepsi f.eks. DG359 Dissemineret sclerose	
DO993B	Psykiske sygdomme f.eks. DF209 Skizofreni f.eks. DF329A Depressiv tilstand	
DO994	Cirkulatoriske sygdomme	Hypertension kodes ikke som cirkulatorisk

DSOG – Anbefalede obstetriske koder

	f.eks. Hjertesygdomme: DI00-DI09, DI16-DI79 eller DI90 – DI99.	sygdom
DO995	Respiratoriske sygdomme f.eks. DJ459 Svær astma	
DO996	Mave-tarm kanalens sygdomme f.eks. DK509 Morbus Crohn f.eks. DK510 Colitis ulcerosa	
DO997	Hudsygdomme	
DO998	Andre specificerede sygdomme (andre sygdomme/tilstande) f.eks. DM069 Rheumatoid arthrit f.eks. DM329 SLE f.eks. DM519 Discusprolaps f.eks. DN819 Prolapsus genitalis f.eks. DZ988 Postoperative tilstande andre specificerede	Kan anvendes ved tilstande efter operationer, som komplicerer graviditets og fødselsforløb

Graviditetskomplikationer

DO100A	Hypertension før graviditeten	Medicinsk behandlet
DO120	Ødemer	Behandlingskrævende (sygemelding/indlæggelse)
DO121	Proteinuri	Over 300mg/døgn , uden hypertension
DO139	Graviditetsbetinget hypertension	Blodtryk \geq 140/90 uden proteinuri
DO140	Let præeclampsi	Blodtryk \geq 140/90 med proteinuri
DO141	Svær præeclampsi	Blodtryk \geq 160 /110 med proteinuri eller påvirkede blodprøver (se Sandbjerg)
DO142	'HELLP' syndrome	ASAT/ALAT > 100 og trombocytter < 100
DO150	Eclampsi	
DO208	Blødning før 22 uger	
DO211	Svær hyperemesis	Som kræver indlæggelse
DO223	Dyb venetrombose	Opstået i graviditeten
DO998A	Hydronefrose under graviditet	
DO230	Pyelonephrit	
DO231	Cystit (Blærebetændelse)	
DO236	Gruppe B streptokok syndrom	Som giver indikation for antibiotikaproylaks ved fødslen
DO240A	Prægestationel diabetes, IDDM	
DO241A	Prægestationel diabetes, NIDDM	
DO244D	Graviditetsdiabetes, diætbehandlet	
DO244E	Graviditetsdiabetes, insulinbehandlet	
DO263	Spiralgraviditet	Hvor spiralen forbliver i uterus
DO264	Herpes gestationis	
DO268H	PUPPP pruritic urticarial papules and plaques of pregnancy	
DO266G	Graviditetskløe (med leverpåvirkning)	Medicinsk behandlet eller medførende igangsættelse
DO267	Svær bækkenløsning	
DO268B	Molimina	Som kræver indlæggelse eller forløsning
DO283	Abnormt fund ved ultralydsundersøgelse	Kan specificeres ved relevant Q-diagnose som tillægskode. Se detaljeret liste "Obstetriske ultralyd".
DO300	Tvillingsvangerskab	Største antal fostre der på noget tidspunkt er set. Koden bruges kun, hvis chorisiteten er ukendt.
DO300C	Dichoriske-diamniotiske tvillinger	
DO300D	Monochoriske-diamniotiske tvillinger	
DO300E	Monoamniotiske tvillinger	
DO301	Trillingsvangerskab	
DO302	Firlingsvangerskab	

DSOG – Anbefalede obstetriske koder

DO308	Flerfold (5+)	
DO312C	Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster (før 22 uger)	
DO312D	Flerfoldsgraviditet efter intrauterin død af foster (efter 22 uger)	
DO430	Tvilling-transfusionssyndrom	
DO320	Ustabil fosterstilling	Hvor dette medfører vending eller forløsning
DO321	Underkropstilling	Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet Ved uerkendt UK kodes DO641A
DO322	Tværleje/skråleje	
DO339	Mekanisk misforhold	Bækkenet er før fødslen bedømt at være for lille til vaginal fødsel (klinisk bedømmelse eller ved måling af CV ved tidligere kejsersnit)
DO340	Uterusanomali	
DO341	Fibromer	Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel
DO342	Tidligere sectio, eller andre operationer på uterus	Som er bidragende/hovedsagelig årsag til sectio.
DO343A	Klinisk cervixinsufficiens	Cervixlængde < 25 mm, som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet
DO348G	Ultralydspåvist kort cervix (< 25 mm)	
DO359A	Misdannet foster	Kan specificeres ved relevant Q-diagnose som tillægskode.
DO360	Rhesus-immunisering	
DO361	Anden immunisering	
DO362	Hydrops fetalis	
DO363	Intrauterin asphyxi under graviditeten	Som indikation for igangsættelse/sectio før fødslen (f.eks ved CTG-forandringer/pathologisk Dopplerflow)
DO364	Intrauterin fosterdød (efter 22 uger)	
DO365	Lille fosterskøn, SGA (< 2 SD)	Diagnosticeret ved ultralyd (< -22%)
DO366	Stort fosterskøn, LGA (> 2 SD)	Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel
DO409	Polyhydramnion	Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel
DO410	Oligohydramnion	Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel
DO411B	Chorioamnionitis	
DO422	Primær vandafgang (PPROM) < 37 uger)	Vandafgang uden veer i 24 timer (< 37 uger) eller forløsning på indikation vandafgang
DO423	Primær vandafgang (PROM) ≥ 37 uger	Vandafgang uden veer (≥ 37 uger) hvor dette fører til igangsættelse
DO438E	Subchorisk hæmatom	
DO449	Placenta prævia	
DO459	Abruptio placentae	Ved verificeret abruptio – ikke kun mistanke herom
DO468A	Blødning i graviditet efter 22 uger	
DO470	Plukkeveer før 37 uger	
DO471	Plukkeveer efter 37 uger	Som medfører indlæggelse eller forløsning
DO472	Truende for tidlig fødsel (+ tocolyse)	Præterme veer, som medfører tokolytisk behandling
DO489	Overbårenhed (graviditas prolongata)	Som indikation for intervention efter 40+0 uger. Medvirkende årsager som f.eks alder, IVF, overvægt kodes også
DO639	Indlæggelse til observation under grav	Anvendes ved indlæggelse under graviditet, hvor der ikke konstateres sygdom
DO710	Uterusruptur før fødslen	Kodes ved alle defekter i myometriet (både hvor peritoneum er intakt og bristet)
<i>KZYM00</i>	Patientens ønske (tillægskode til indgreb)	Koden skal anføres som tillægskode til operationskoden. Den er her anført sammen med diagnoserne idet den opfattes som en indikation

Fødselskomplikationer

DO622	Vesvækkelse eller dårlig progression	Som indikation for indgreb (incl dystoci og mislykket igangsættelse)
DO623	Styrtfødsel (ved samtidig komplikation)	
DO624D	Hyperton uterus (vestorm)	Som kræver tocolytica
DO630A	Forlænget latensfase	Som indikation for indgreb eller indlæggelse
DO640	Uregelmæssig hovedpræsentation	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO641	UK/Skråleje/Tværleje	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO641A	Uerkendt UK (efter fødselsstart)	
DO642	Ansigtpræsentation	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO643	Pandepræsentation	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO644	Skulderpræsentation	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO640G	Høj lige stand	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO640H	Asynklitisk hovedpræsentation	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO654	Mekanisk misforhold (disproportio)	Forliggende fosterdel trænger ikke ned i bækkenet (svarende til orificiums åbningsgrad)
DO660	Skulderdystoci	Kun ved behov for indvendige håndgreb
DO665	Mislykket vacuumelekstraktion/tangforløsning	
DO679	Blødning under fødslen	Som indikation for speciel overvågning eller indgreb
DO680F	Asphyxi-påvirket hjl/CTG	Som indikation for indgreb
DO681	Asphyxi-mekonium	Som indikation for indgreb
DO682	Asphyxi-CTG+mekonium	Som indikation for indgreb
DO683	Asphyxi-scalp-pH	Som indikation for indgreb
DO688B	Asphyxi-STAN	Som indikation for indgreb
DO690	Navlesnorsfremfald	
DO700	Perinealruptur grad I (hud og slimhinde)	
DO701	Perinealruptur grad II (muskulatur og fascia)	
DO702	Perinealruptur grad III	
DO702B	Læsion af rectovaginale fascie	
DO702D	Sphincterruptur grad 3a (<50%)	
DO702E	Sphincterruptur grad 3b (>50%)	
DO702F	Ruptur af interne sphincter	
DO703	Perinealruptur grad IV, incl. rectalslimhinde	
DO704	Isoleret læsion af rectal/anal slimhinde	
DO758A	Truende uterusruptur	Hvor der foretages sectio på mistanke om ruptur. Hvis mistanken bekræftes kodes også DO711AA eller DO711AB
DO711AA	Partiel uterusruptur (peritoneum intakt)	Kodes ved defekter i myometriet, hvor peritoneum er intakt.
DO711AB	Komplet uterusruptur (myometrium+peritoneum)	Kodes ved defekt i myometriet, hvor peritoneum også er bristet.
DO713	Collumruptur	
DO714	Vaginalruptur (kun udtalte)	Ved samtidig perinealruptur kodes kun perinealrupturen
DO715B	Blærelæsion	
DO717	Hæmatom i fødselsvejen	Kun behandlingskrævende
DO730	Fastsiddende placenta/retineret væv	
DO730A	Placenta accrete (uspecificeret)	
DO730A1	Placenta accrete	
DO730A2	Placenta increta	
DO730A3	Placenta percreta	
DO720	Blødning indenfor 24 h efter fødsel (VPHxxxx)	Obligatorisk oplysning med tillægskode VPHxxxx (ml). Blødning over 9999 ml angives som VPH9999.

DSOG – Anbefalede obstetriske koder

DO722	Blødning senere end 24 h efter fødsel (VPHxxxx)	Blødning over 9999 ml angives som VPH9999.
DO750	Udmattet moder	Som indikation for indgreb
DO752	Feber under fødslen/chorioamnionit (tp > 38)	

Fødselens aktionsdiagnose

DO80-DO84

Puerperiet

DZ390	Pleje og undersøgelse efter fødslen	Ved genindlæggelse af moder på grund af indlæggelse af barnet
DO859A	Endometrit/puerperal sepsis	Som giver anledning til antibiotikabehandling
DO860A	Sårinfektion, kejsersnit	Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh
DO861C	Sårinfektion, fødselsvejen	Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh
DO862A	Blærebetændelse (cystit)	
DO871	Dyb venetrombose	
DO882D	Lungeemboli	
DO894	Spinal hovedpine	
DO900	Sårruptur, kejsersnit	Som giver anledning til kirurgi
DO908B	Sårruptur, fødselsvejen	Som giver anledning til kirurgi
DO902	Hæmatom i cicatricen	Som giver anledning til kirurgi
DO911	Mamma absces	
DO912I	Mastit	Som giver anledning til antibiotikabehandling
DO925	Medicinsk hæmning af mælkeproduktion	
DR339	Retentio urinae (> 500 ml)	
DK566H	Ogilvie's syndrom (caecum >10 cm)	
DO959	Obstetrisk død (moder) af ukendt årsag	
DO969	Obstetrisk død (moder) >42 dage og <1 år efter fødsel	
DO990A	Anæmi (ved blodtransfusion)	

Operationer og indgreb

DZ131	Scening for graviditetsdiabetes	
KMAB00	Vaginal anlæggelse af cerclage (i graviditet)	
KMAB03	Fjernelse af cerclage	
KLDD10A	Abdominal anlæggelse af cerclage	
KMAB10	Ydre vending	
KMAB20	Mislykket ydre vending	
BKHA1	Behandling med progesteron (forebyggelse af præterm fødsel)	
BKHG	Behandling med vehæmmende midler	
BBHF32	Celestonprofylakse	
KMAC00	Igangsættelse med amniotomi (HSP)	Anvendes kun til den først anvendte metode
KMAC96A	Igangsættelse med ballonkatheter	Anvendes kun til den først anvendte metode.
BKHD20	Igangsættelse med prostaglandin	Anvendes kun til den først anvendte metode.
BKHD21	Igangsættelse med oxytocin	Anvendes kun til den først anvendte metode.
KMAC05	Amniotomi (HSP) under fødslen	Før orificium er udslettet
KMAC30	Amnioinfusion under fødsel	
KMAC96B	Anvendelse af ballonkatheter	Under igangsat fødsel. Hvis ballonkatheter er den primære metode kodes KMAC96A
BKHD30	Vestimulation med prostaglandin	
BKHD31	Vestimulation med oxytocin	
BKXA31	Vestimulation med akupunktur	
KTMD00	Episiotomi (incl. suturering)	Inklusive eventuelle udrifter som ikke involverer sphincter
KMAE00	Vacuumeekstraktion (udgangsekstraktion)	
KMAE03	Vacuumeekstraktion (middelhøj/høj)	

DSOG – Anbefalede obstetriske koder

KMAE20	Mislykket vacuumeekstraktion (+ sectio)	
KMAF00	Tangforløsning	
KMAF20	Mislykket tangforløsning (+ sectio)	
KMAH15	Skulderløsning	Ved behov for indvendige håndgreb
KMAG20	Indre vending og ekstraktion	
KMBA03	Evacuatio	
KMBA10	Intrauterin palpation	
KMBA30	Manuel placentafjernelse	
KMBA30A	Manuel cotyledonfjernelse	
KMBB10	Tamponade af cavum uteri	
KMBW96A	Uterussutur ved atoni (B-Lynch)	
KMBC00	Sutur af collum	
KMBC10	Sutur af vagina	
KMBC30	Sutur af perineum (excl. sphincter)	
KMBC33	Sutur af perineum (incl sphincter)	
KMBC40	Revision af (paravaginalt) hæmatom i fødselsvejen	
KMCA10A	Kejsersnit akut udført før fødslen	Udført < 8 timer efter beslutning
KMCA10B	Kejsersnit planlagt og udført før fødslen	Udført mere end 8 timer efter beslutning
KMCA10D	Kejsersnit under fødslen, tidligere planlagt	Kejsersnit var planlagt, men der kom veer eller vandafgang forinden eller det drejede sig om en uerkendt graviditeskompl (UK)
KMCA10E	Kejsersnit udført akut under fødslen	
KLCD00	Hysterektomi (som fødselskomplikation)	
KLGA00	Sterilisation (i forbindelse med sectio)	
KLGA21	Laparoskopisk sterilisation	
BKHD0	Uteruskontraherende midler efter fødslen	Inkluderer ikke profylaktisk behandling
BOQA0	Blodtransfusion	
KMCC00	Sutur af uterusruptur	
KMWA00	Sutur af sårruptur	
KMWB00	Reoperation for overfladisk sårinfektion	
KMWC00	Reoperation for dyb sårinfektion	
KMWD00	Reoperation for overfladisk blødning	
KMWE00	Reoperation for dyb blødning	
KMWW96	Anden reoperation efter obstetrisk operation	
KMBA03	Primær evacuatio uteri	
KMWW00	Re-evacuatio	Primær evacuatio kodes KMBA03
BVAA7	Samtale efter fødslen	
BVAA70	Samtale efter dødfødsel	

Anæstesi

NAAC	Generel anæstesi	
NAAD1	Spinal anæstesi	
NAAD0A	Epidural anæstesi	Evt. ved samme epiduralkatheter som er anlagt til smertelindring.

Smertelindring

NAAD0B	Epidural analgesi	
NAAD12	Fødespinal	
NAAD43	Pudendusblokada	
NAAD53	Paracervicalblokada	
BAFA7	Infiltrationsanalogesi	
BAFA80	Akupunktur	
BAFA81	Lattergas	
BAFA83	Zoneterapi	
BAFA87	Steriltvandspapler	
BKQA0	Badekar	

BAHY0	Pethidin/morfin	
-------	-----------------	--

Andre procedurer under fødslen

BKZB	Fødsel i vand	
ZZ4234	CTG (Door-step)	
ZZ4223	CTG (anvendt udover door-rstep CTG)	
ZZ2688	STAN	
ZZ4227	Skalp-pH	

Ultralydsundersøgelser

<i>Ukomplerede</i>		
UXUD 85	UL-undersøgelse af cervix	
UXUD 86	UL/Doppler af foster og placenta	
UXUD 86A	Obstetrisk ultralydskanning, type 1	
UXUD 86D	Diagnostisk obstetrisk UL-skanning på speciel indikation	
UXUD 86DA	Op-ned skanning	
UXUD 86DB	UL-skanning for placentalokalisation	
UXUD 86DC	Vægtskanning	
UXUD 87	Transvaginal UL-undersøgelse af foster og placenta	
UXUD 87A	Transvaginal obstetrisk ultralydsskanning, type 1	
UXUD 87B	Transvaginal obstetrisk ultralydsskanning, type 2	
UXUD 87N	Transvaginal nakkefoldsskanning med risikoberegning	
UXUD 88	UL/Doppler af navlesnorsflow/føto-maternelt kredsløb	
<i>Komplerede</i>		
UXUD 86AA	UL-choriocitetsbestemmelse	
UXUD 86B	Obstetrisk ultralydskanning, type 2	
UXUD 86N	Abdominal nakkefoldsskanning med risikoberegning	
UXUD 88A	Flowmåling i arteria umbilicalis	
UXUD 88F	Flowmåling i arteria uterina	
<i>Meget komplerede</i>		
UXUD 86BE	Misdannelsediagnostik, ekspertsikanning	
UXUD 86C	Fosterekkokardiografi	
UXUD 86E	Fosterekkokardiografi - tvillingeundersøgelse	
UXUD 86X	Tidlig obstetrisk abdominal gennemskanning (ekspert)	
UXUD 88B	Flowmåling i venae umbilicalis	
UXUD 88C	Flowmåling i arteria cerebri media	
UXUD 88D	Flowmåling i ductus venosus	
UXUD 88E	Flowmåling over hjerteklapper	
UXUD 88H	Flowmåling i andre kar	
UXUD 88G	Flowmåling i anastomoser i placenta	

Børnediagnoser

DP70.4	Hypoglykæmi (< 2.5 mM)	
DP59.9	Icterus (behandlingskrævende)	
DP12.0	Kefal hæmatom (+ smertestillende)	

DSOG – Anbefalede obstetriske koder

DQ65.2	Hofteluksation	
DP13.	Clavicol fraktur	
DP14.0	Duchenne-Erb's paralyse	
DQ35.9	Ganespalte	
DQ36.9	Læbespalte	
DQ37.9	Læbe-Ganespalte	
DQ53.9	Retentio testis	
DQ54.9	Hypospadi	
DQ66.9	Klumpfod	
DQ70.9	Sammenvoksning af fingre / tæer	
DQ 69	Overtallige fingre / tæer	
DQ278	Single umbilical arterie	

Moder (obligatoriske felter/tillægskoder)

DUTnn	Rygning	00: Ryger ikke, 10: ophørt 1. trim, 11: ophørt efter 1. trim, 20: < 5 dgl, 21: 6-10, 22: 11-20, 23: >20
DunnDn	Gestationsalder ved fødsel (uger+dage)	Antallet af uger er obligatorisk, hvorimod antallet dage kan markeres med "x", hvis den eksakte gestationsalder er ukendt.
ZZ0240 + DU0000+nxxx	Prægravid vægt	Registreres som procedure med resultat som tillægskode
ZZ0241 + DU0000+nxxx	Højde	Registreres som procedure med resultat som tillægskode
	Paritet	Antal tidligere fødsler inklusive den aktuelle (dødfødte >154 dage og alle levendefødte)

Barnet (obligatoriske felter/tillægskoder)

-	Flernummer	
-	Vægt	
-	Længde	
DUPnn	Præsentation	
DUHnn	Hovedomfang (cm)	
DUAnn	Abdominalomfang (cm)	
DVnnnn	Placentavægt (g)	
DVAnn	Apgar 5'	
ZZ4232A + nnn	Navlearterie-pH	
ZZ4229A + nnn	Navlearterie-Base-Excess	
ZZ4232V + nnn	Navlevene-pH	
ZZ4229V + nnn	Navlevene-Base-Excess	

Koder til NIP indikatorer

NZTB00+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for bestilling af epidural	
NAAD0B+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for påbegyndt anlæggelse af epidural	Tidspunkt for indstik
BKVD1	Fagpersonale kontinuerligt tilstede i fødselens aktive fase (orificium > 4 cm)	Frasæt korte pauser
NZTB10A+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for melding af grad 1 sectio	
NZTB10B+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for melding af grad 2 sectio	
NZTB10C+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for melding af grad 3 sectio	
KMCA10A+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio før fødslen	

Sidst revideret: Nov. 2011. Næste opdatering: Jan 2012. DAGS og DRG relevante koder er med fed angivelse

DSOG – Anbefalede obstetriske koder

KMCA10D+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio under fødslen (tidligere planlagt)	Kejsersnit var planlagt, men der kom veer eller vandafgang forinden eller det drejede sig om en uerkendt graviditeskompl (UK)
KMCA10E+mm-tt-dd-mm-yyyy	Tidspunkt for barnets fødsel ved akut sectio under fødslen	
BKVC1	Hud til hud kontakt mellem mor og barn indenfor 2 timer post partum	I mindst 1 time eller til barnet har suttet

Henvendelse vedrørende ønsker om nye koder kan rettes til:

Jens Langhoff-Roos jens.langhoff-roos@rh.regionh.dk

Lone Krebs lone.krebs@dadlnet.dk