

# Obstetriske diagnoser

## Prægravide risikofaktorer mm

DZ340	Svangrekontrol af 1. gangsfødende	
DZ348	Svangrekontrol af flergangsfødende	
DZ358	Kontrol af højrisikograviditet	
DZ390	Pleje og undersøgelse efter fødslen	F.eks moder indlagt på barselafdeling på grund af indlæggelse af barnet
DZ358F	Graviditet efter IVF	
DZ358H	Graviditet efter hormonstimulation	
DE66	Fedme/adipositas	Som indikation for intervention f.eks. glucose-belastning, kostråd etc.
DF102	Alkoholafhængighed	
DF112	Narkomani	
DZ225	Bærer af Hepatitis B virus	
DD685	Trombofili	
DZ907D	Følger efter omskæring	
DZ358E	Sectio antea	Hvor det tidligere kejsersnit er en indikation for nyt kejsersnit skal det også kodes som DO342. Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel.
DZ358D	Tidligere traumatisk graviditet/fødsel/udfald	Se "Sandbjerg guidelines"
DZ875A	Anamnese med cervixinsufficiens	
DZ875B	Tidligere anlagt abdominal cerclage	
DZ928C	Tidligere koniseret	Som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet/fødsel.
DZ875C	Anamnese med sphincterruptur	

## Infektionssygdomme i graviditet

DO980B	Tuberculose
DO981B	Syphilis
DO982B	Gonorrhoea
DO984B	Hepatitis
DO985	Andre virale sygdomme
DO986B	Protoz sygdomme
DO988	Andre infektionssygdomme og parasit sygdomme

## Komplicerende medicinske sygdomme

Når de anvendes skal der altid være yderligere mindst en kode, der angiver den specifikke medicinske sygdom		
DO991A	Hæmatologiske sygdomme	Eksklusive anæmi som skyldes mangelfuld ernæring
DO992A	Endokrinologiske sygdomme	
DO993A	Neurologiske sygdomme	
DO993B	Psykiske sygdomme	
DO994	Cirkulatoriske sygdomme	
DO995	Respiratoriske sygdomme	
DO996	Mave-tarm kanalens sygdomme	
DO997	Hudsygdomme	
DO998	Andre specificerede sygdomme	Herunder nyresygdomme
DO998A	Hydronefroser under graviditet	

## Graviditetskomplikationer

DO100-160	kan også anvendes hvis tilstanden debuterer under fødslen eller i puerperiet	
DO100A	Hypertension før graviditeten	Medicinsk behandlet hypertension
DO120	Ødemer	Behandlingskrævende (sygemelding/indlæggelse)
DO121	Proteinuri	Over 300mg/døgn , uden hypertension
DO139	Graviditetsbetinget hypertension	Blodtryk $\geq$ 140/90 uden proteinuri
DO140	Let præeclampsi	Blodtryk $\geq$ 140/90 med proteinuri
DO141	Svær præeclampsi	Blodtryk $\geq$ /110 med proteinuri
DO142	'HELLP' syndrom	ASAT/ALAT > 100 og trombocytter < 100
DO150	Eclampsi	
DO208	Blødning før 22 uger	
DO211	Svær hyperemesis	Kræver indlæggelse
DO223	Dyb venetrombose	Medfører AK-behandling (BOHA0)
DO230	Pyelonephrit	
DO231	Blærebetændelse (cystit)	
DO236	Gruppe B streptokok syndrom	Se "Sandbjerg guidelines"
DO240A	Prægestationel diabetes, IDDM	Insulin-behandlet
DO241A	Prægestationel diabetes, NIDDM	Diæt-behandlet
DO244D	Graviditetsdiabetes, diætbehandlet	
DO244E	Graviditetsdiabetes, insulinbehandlet	
DO263	Spiralgraviditet	Hvor spiralen forbliver i uterus
DO266G	Graviditetskløe (med leverpåvirkning)	Se "Sandbjerg guidelines"
DO267	Svær bækkenløsning	Kræver indlæggelse
DO268B	Molimina	Kræver indlæggelse eller forløsning
DO283	Abnormt fund ved ultralydsundersøgelse	Kan specificeres ved relevant Q-diagnose som til-lægskode. Se detaljeret liste "Obstetrisk ultralyd".
DO300	Tvillingesvangskab	Største antal fostre der på noget tidspunkt er set. Koden bruges kun, hvis der ikke vides noget om choriositet.
DO300C	Dichoriske-diamniotiske tvillinger	Største antal fostre der på noget tidspunkt er set
DO300D	Monochoriske-diamniotiske tvillinger	Største antal fostre der på noget tidspunkt er set
DO300E	Monoamniotiske tvillinger	Største antal fostre der på noget tidspunkt er set
DO301	Trillingsvangskab	Største antal fostre der på noget tidspunkt er set
DO302	Firlingsvangskab	Største antal fostre der på noget tidspunkt er set
DO308	Flerfold (5+)	Største antal fostre der på noget tidspunkt er set
DO312C	Flerfoldsgraviditet med intrauterin død af foster (før 22 uger)	
DO312D	Flerfoldsgraviditet efter intrauterin død af foster (ef-ter 22 uger)	
DO430	Tvilling-transfusionssyndrom	
DO320	Ustabil fosterstilling	Hvor dette medfører vending eller forløsning
DO321	Underkropstilling	Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet
DO322	Tværleje/skråleje	Kun hvor præsentationen er erkendt før fødslen er startet
DO339	Mekanisk misforhold	Bækkenet er bedømt at være for lille til vaginalfødsel (klinisk bedømmelse eller ved måling af CV ved tidligere kejsersnit)
DO340	Uterusanomali	
DO341	Fibromer	Som medfører ekstra overvågning/intervention un-der graviditet/fødsel
DO342	Tidligere sectio, eller andre operationer på uterus	Som er bidragende/hovedsagelig årsag til sectio.

DO343A	Klinisk cervixinsufficiens	Se "Sandbjerg guideline"
DO348G	Ultralydspåvist kort cervix	Cervixlængde < 25 mm, som medfører ekstra overvågning/intervention under graviditet
DO359A	Misdannet foster	Kan specificeres ved relevant Q-diagnose som til-lægskode. Se detaljeret liste "Obstetrisk ultralyd".
DO360	Rhesus-immunisering	
DO361	Anden immunisering	
DO362	Hydrops fetalis	
DO363	Intrauterin asphyxi under graviditeten	Som indikation for igangsættelse/sectio før fødslen (f.eks ved CTG-forandringer/pathologisk Dop-plerflow)
DO364	Intrauterin fosterdød (efter 22 uger)	
DO365	Lille fosterskøn, SGA	< 2 SD (Se "Sandbjerg guideline") Som medfører ekstra overvågning/intervention under gravidi-tet/fødsel
DO366	Stort fosterskøn, LGA	> 2 SD (Se "Sandbjerg guideline") Som medfører ekstra overvågning/intervention under gravidi-tet/fødsel
DO409	Polyhydramnion	Som medfører ekstra overvågning/intervention un-der graviditet/fødsel
DO410	Oligohydramnion	Som medfører ekstra overvågning/intervention un-der graviditet/fødsel
DO411B	Chorioamnionitis	Se "Sandbjerg guidelines"
DO422	Primær vandafgang (PPROM)	Vandafgang uden veer i 24 timer (< 37 uger) eller forløsning på indikation vandafgang
DO423	Primær vandafgang (PROM)	Vandafgang uden veer (>= 37 uger) hvor dette fø-rer til igangsættelse
DO438E	Subchorisk hæmatom	
DO449	Placenta praevia	
DO459	Abruptio placentae	
DO468A	Blødning i graviditet efter 22 uger	
DO470	Plukkeveer før 37 uger	Som medfører indlæggelse eller forløsning
DO471	Plukkeveer efter 37 uger	Som medfører indlæggelse eller forløsning
DO472	Truende for tidlig fødsel	Præterme veer, som medfører tokolytisk behand-ling
DO489	Overbårenhed (graviditas prolongata)	Som medfører særlig overvågning eller forløsning
DO710	Uterusruptur før fødslen	Kodes ved alle defekter i myometriet (både hvor peritoneum er intakt og bristet)
KZYM00	Patientens ønske (som indikation for indgreb). Ma-ternal request.	Koden skal anføres som tillægskode til operations-koden. Den er her anført sammen med diagnoser-ne idet den opfattes som en indikation

## Fødselskomplikationer

DO622	Vesvækkelse eller dårlig progression	Som indikation for indgreb (incl dystoci og mislyk-ket igangsættelse)
DO623	Styrtfødsel	Hvor dette har givet anledning til komplikationer hos moder eller barn
DO624D	Hyperton uterus (vestorm)	Som kræver tocolytica
DO630A	Forlænget latensfase	Som indikation for indgreb eller indlæggelse
DO640	Uregelmæssig hovedpræsentation	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO641	Underkropspræsentation/Skråleje/Tværleje	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO641A	Uerkendt underkropspræsentation	Erkendt efter fødslen er startet (uanset om den gi-

DO642	Ansigtspresentation	ver anledning til indgreb eller ej) Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO643	Pandepresentation	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO644	Skulderpresentation	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO640G	Høj lige stand	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO640H	Asynklitisk hovedpresentation	Som indikation for indgreb uanset præsentation ved fødslen
DO654	Mekanisk misforhold (disproportio)	Foreliggende fosterdel trænger ikke ned i bækkenet (svarende til orificiums åbningsgrad)
DO660	Fastsiddende skuldre (skulderdystoci)	Fastsiddende skuldre som giver anledning til (specielle) håndgreb
DO665	Mislykket vacuumekstraktion/tangforløsning	
DO679	Blødning under fødslen	Som indikation for speciel overvågning eller indgreb
DO680F	Asphyxi-påvirket hjl/CTG	Som indikation for indgreb
DO681	Asphyxi-mekonium	Som indikation for indgreb
DO682	Asphyxi-CTG+mekonium	Som indikation for indgreb
DO683	Asphyxi-scalp-pH	Som indikation for indgreb
DO688B	Asphyxi-STAN	Som indikation for indgreb
DO690	Navlesnorsfremfald	
DO700	Perinealruptur grad I (hud og slimhinde)	
DO701	Perinealruptur grad II (muskulatur og fascia)	
DO702D	Perinealruptur grad III, partiel sphincterruptur	
DO702E	Perinealruptur grad III, total sphincterruptur	
DO703	Perinealruptur grad IV, incl. anal/rectalslimhinde	Kodes ved defekter i myometriet, hvor peritoneum er intakt. Ved ikke bekræftet mistanke om uterusruptur kodes DZ038 + DO711AA)
DO711AA	Partiel uterusruptur	Kodes ved defekt i myometriet, hvor peritoneum også er bristet.
DO711AB	Komplet uterusruptur	
DO713	Collumruptur	
DO714	Vaginalruptur	Kun udtalte vaginalrupturer kodes; ved samtidig perinealruptur kodes kun perinealrupturen
DO715B	Blærelæsion	
DO717	Hæmatom i fødselsvejen	Kun behandlingskrævende.
DO720	Fastsiddende placenta/retineret væv	Kodes kun når den fjernes manuelt eller kirurgisk
DO721A	Post partum blødning	Som indikation for indgreb (oxytocin-drop etc.)
DO722E	Placenta accreta	
DO750	Udmattet moder	Som indikation for indgreb
DO752	Feber under fødslen/chorioamnionit	Se Sandbjerg guidelines

## Puerperiet

DO859A	Endometrit/puerperal sepsis	Som giver anledning til antibiotikabehandling
DO860A	Sårinfektion, kejsersnit	Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh.
DO861C	Sårinfektion, fødselsvejen	Som giver anledning til kirurgi eller antibiotikabeh.
DO862A	Blærebetændelse (cystit)	
DO871	Dyb venetrombose	
DO882D	Lungeemboli	
DO894	Spinal hovedpine	
DO900	Sårruptur, kejsersnit	Som giver anledning til kirurgi

DO908B	Sårruptur, fødselsvejen	Som giver anledning til kirurgi
DO902	Hæmatom i cicatricen	Som giver anledning til kirurgi
DO911	Mamma absces	Som giver anledning til kirurgi
DO912I	Mastit	Som giver anledning til antibiotikabehandling
DO925	Medicinsk hæmning af mælkeproduktion	
DR339	Retentio urinae	Katherisering > 500 ml
DK566H	Ogilvie's syndrom (Pseudo-obstruktion af colon)	Coecumdilatation > 10 cm
DO959	Obstetrisk død (moder) af ukendt årsag	
DO969	Obstetrisk død (moder) >42 dage og <1 år efter fødsel	
DO990A	Anæmi	Som giver anledning til blodtransfusion

## Moder

### (obligatoriske felter/tillægskoder)

DUTnn	Rygning (tillægfelt til O80 og obligatorisk variabel)	0=DUT00, <5= DUT 20, 6-10= DUT 21, 11-20= DUT 22, >20= DUT 23
-	Paritet (tillægfelt til O80 og obligatorisk variabel)	Antal tidligere fødsler inklusive den aktuelle (død-fødte ≥154 dage og alle levendefødte)
DunnDn	Gestationsalder ved fødsel (uger+dage)	Antallet af uger er obligatorisk, hvorimod antallet dage kan markeres med "x", hvis den eksakte gestationsalder er ukendt.
ZZ0240 + DU0000 + nnnn	Prægravid vægt	Registreres som procedure med resultat som tillægskode
ZZ0241 + DU0000 + nnnn	Højde	Registreres som procedure med resultat som tillægskode

## Barnet

### (obligatoriske felter/tillægskoder)

-	Flernummer
-	Vægt
-	Længde
DUPnn	Præsentation
DUHnn	Hovedomfang (cm)
DUAnn	Abdominalomfang (cm)
DVnnnn	Placentavægt (g)
DVAnn	Apgar 5'
ZZ4232 + nnn	Navlearterie-pH
ZZ4229 + nnn	Navlearterie-Base-Excess

# Obstetriske interventioner

(operationer, indgreb, anæstesi, smertelindring og andre procedurer)  
(Ultralydskoder samt fund og indgreb ses under Føtal-medicinske koder)

## Operationer og indgreb

ZZ2004	Glucosebelastning	
KMAB00	Vaginal anlæggelse af cerclage	I graviditet
KMAB03	Fjernelse af cerclage	
KLDD10A	Abdominal anlæggelse af cerclage	Før graviditet
KMAB10	Ydre vending	
KMAB20	Mislykket ydre vending	
BKHG	Behandling med vehæmmende midler	
Igangsættelser kodes efter klinisk bedømmelse således at indgreb der foretages før patienten er i aktiv fase kodes som igangsættelse, og efterfølgende som stimulation (på grund af vesvækkelse).		
KMAC00	Igangsættelse med amniotomi (HSP)	
KMAC96A	Igangsættelse med ballonkatheter	
BKHD20	Igangsættelse med prostaglandin	
BKHD21	Igangsættelse med oxytocin	
KMAC05	Amniotomi (HSP) under fødslen	Før orificium er udslettet
KMAC30	Amnioinfusion under fødsel	
KMAC96B	Anvendelse af ballonkatheter	Under igangsat fødsel
BKHD30	Vestimulation med prostaglandin	
BKHD31	Vestimulation med oxytocin	
BKXA31	Vestimulation med akupunktur	
KTMD00	Episiotomi (incl. suturering)	Inklusive eventuelle udrifter som ikke involverer sphincter
KMAE00	Vacuumeekstraktion (udgangsekstraktion)	
KMAE03	Vacuumeekstraktion (middelhøj/høj)	Caput over bækkenbunden
KMAE20	Mislykket vacuumeekstraktion	Kodes kun ved efterfølgende kejsersnit
KMAF00	Tangforløsning	
KMAF20	Mislykket tangforløsning	
KMAG20	Indre vending og ekstraktion	
KMBA03	Evacuatio	
KMBA10	Intrauterin palpation	
KMBA30	Manuel placenta fjernelse	
KMBA30A	Manuel cotyledon fjernelse	
KMBB10	Tamponade af cavum uteri	
KMBW96A	Uterussutur ved atoni (B-Lynch)	
KMBC00	Sutur af collum	
KMBC10	Sutur af vagina	
KMBC30	Sutur af perineum (excl. sphincter)	
KMBC33	Sutur af perineum (incl sphincter)	
KMBC40	Revision af (paravaginalt) hæmatom i fødselsvejen	
KMCA10A	Kejsersnit akut udført før fødslen	Udført < 8 timer efter beslutning
KMCA10B	Kejsersnit planlagt og udført før fødslen	Udført mere end 8 timer efter beslutning
KMCA10D	Kejsersnit under fødslen, tidligere planlagt	Kejsersnit var planlagt men der kom spontane veer eller vandafgang forinden

KMCA10E	Kejsersnit udført akut under fødslen	
KLCD00	Hysterektomi	Hysterektomi i forbindelse med kejsersnit eller anden komplikation til fødslen
KLGA00	Sterilisation	Sterilisation i forbindelse med kejsersnit
BKHD0	Uteruskontraherende midler efter fødslen	Inkluderer ikke profylaktisk behandling
BOQA0	Blodtransfusion	
KMCC00	Sutur af uterusruptur	
KMWA00	Sutur af sårruptur	
KMWB00	Reoperation for overfladisk sårinfektion	
KMWC00	Reoperation for dyb sårinfektion	
KMWD00	Reoperation for overfladisk blødning	
KMWE00	Reoperation for dyb blødning	
KMWW96	Anden reoperation efter obstetrisk operation	
KMWW00	Re-evacuatio	Primær evacuatio kodes KMBA03
KLGA21	Laparoskopisk sterilisation	

## Anæstesi

NAAC	Generel anæstesi	
NAAD1	Spinal anæstesi	
NAAD0A	Epidural anæstesi	Evt. ved samme epiduralkatheter som er anlagt til smertelindring.

## Smertelindring

NAAD0B	Epidural analgesi
NAAD12	Fødespinal
NAAD43	Pudendusblokade
NAAD53	Paracervicalblokade
BAFA7	Infiltrationsanalogesi
BAFA80	Akupunktur
BAFA81	Lattergas
BAFA83	Zoneterapi
BAFA87	Steriltvandspapler
BKQA0	Badekar
BAHY0	Pethidin/morfin

## Andre procedurer

BKZB	Fødsel i vand	
ZZ2687	CTG	På noget tidspunkt under fødslen
ZZ2688	STAN	På noget tidspunkt under fødslen
ZZ4227	Skalp-pH	