

Barrieremetoder

Nonoxynol-9

- Surfactant
- Spermicid
- Aktivt overfor bl.a. gonokokker og HIV - in vitro
- Aktive ingrediens i div. spermicider
- Pessarcreme
- Kondomcreme

Beskadiger mucosa \Rightarrow vulnerabilitet \uparrow \Rightarrow smitterisiko \uparrow (HIV, HPV); allergi

Barriere metoder

Lars Franch Andersen

Hillerød

Barrieremetoder

NON - Nonoxynol-9

- Surfactant
- Spermicid
- Aktivt overfor bl.a. gonokokker og HIV - in vitro
- Aktive ingrediens i div. spermicider
- Pessarcreme
- Kondomcreme

Beskadiger mucosa \Rightarrow vulnerabilitet \uparrow \Rightarrow smitterisiko \uparrow (HIV, HPV); allergi

Barrieremetoder

Pessarcreme

- Mekanisk barrrie "kit"
 - Pessar 440 kr
 - Pessarcreme 65-99 kr /100 ml
- Kemisk barriere
 - Sæber
 - ricinolsyre

NON - Nonoxynol-9

Barrieremetoder

Kondomer

- Latex
- Polyuretan
- Fåretarm
- Pris 3-30 kr
- Forskellige
 - tykkelser
 - former
 - faconer
- Kemikalier & farmaka
 - Farver
 - Smag
 - Lugte
 - Lys
 - Kølende
 - Varmende
 - Lokalbedøvende
- Ring

NON - Nonoxynol-9

Barrieremetoder

Femidom

- Latex
- Polyuretan
- Pris 20-30 kr

NON - Nonoxynol-9

Kobberspiral

- Nullipara - nulligravida

Koberspiral hos nullipara

	Wiener 1978 (n=226, 6 mdr.)	Skouby 1981 (n=120, 12 mdr.)	Petersen 1991 (n=236, 12 mdr.)
Ophør (%)			
Udstødt	12	7	10
Blødning/smerter	5	14	13
Gravid	2	2	0
Underlivsbetændelse	2	6	9
Personlige års.	0	6	3
Fortsætter (%)	79	66	65

Kobberspiral

Nullipara – nulligravida

Hubacher D. Contraception 2007;75;8-11 (Review)

- Hyppigere udstødning
- Flere fjernes p.gr.a. blødning / smerter
- Ikke absolut kontraindikation
- Spiralstørrelse af betydning
- Information
- Cytotec 0,4 mg + NSAID/paracetamol 2 t før oplægning
- Lokalanalgesi

Kobberspiral

Liggetid

- Afhængig af kobbermængde
- Anbefalet (3 -) 5 - 8 år
- Holder formentlig mindst 10 - 12 år.....

- Større risiko for tubo-ovariel absces ved spiral
>5 år ?
- Candida ?
- Actinomyose ?

Charonis G, Acta Obstet Gynecol 2009; 88:680-4

Kobberspiral

Ekstrauterint

- Skal ekstrauterint – intraperitonealt – beliggende asymptomatisk kobberspiral altid fjernes?

Kobberspiralbrug blandt infertile kvinder m. tuba-faktor, ikke-tuba-faktor samt fertile kvinder

