

Hot Topics II

Graviditetsrelateret trombose

- Nylavet folder om graviditetsrelateret trombose gennemgås af Anita Sylvest.
- Nye risikofaktorer bliver tilføjet/ændret:
 - Indlæggelseskrævende infektion
 - Indlagte gravide med cancere
 - Prægravid BMI >40
 - Immobilisering over 3 dage
 - CVK anlæggelse
- IVF giver ikke i sig selv indikation for LMH men indgår som samlet risikofaktor

- Doserings af LMH

- Såfremt prægravid AK behandling med DOAK grundet tidligere VTE skal skifte til terapeutisk heparin
- Antifosfolipid syndrom med klinisk manifestation værende venøs trombose og allerede i antikoagulerende behandling skiftes til terapeutisk heparin

- Magnyl

- Antifosfolipidsyndrom: tilfældigt fundet, aldrig tromboemboliske lidelse ->ASA 150 mg.
- Tidligere stroke: ASA 75mg x 1 dagligt

- Knælange støttestrømper er ligestillede med hofte lange.
- Ved lav klinisk mistanke om DVT OG lav d-dimer, ikke behov for yderligere udredning.
- Igangsættelse: profylaktisk dosering -> afvente spontan fødsel.

Obstetrisk kodning

- Obstetrisk kodemøde 13. marts på Rigshospitalet
- Mission: bedre data for medfødte misdannelser, neonatale udfald, hjemmefødsler.
- Nyt fra DKF
 - "vægt ved fødslen/vægtøgning i graviditeten" –en kvalitetsdatabase
 - Indikation:
 - Vægt ved fødslen
 - Vægtøgning gennem graviditeten, slutvægt måles indenfor 14 dage efter fødslen.
- Ønske om at identificere dem der tager på gennem en graviditet, da det er forbundet med øget antal komplikationer såsom hypertension, sectio, skulderdystoci
- Øget prævalens af gravide med BMI >40 (2 %), opadgående kurve.

Dansk applikation for TOLAC

- Ida Thagaard og Lone Krebs
- Brug af fødselsdata til at lave en prediktionsmodel for TOLAC ved hjælp af machine learning/AI
- Testet i klinisk brug
- Indtaste: tidligere fødsel, højde, vægt, epidural. Der udregnes en procentsats for sandsynligheden for vaginal fødsel efter sectio.
- Ikke implementeret endnu