

## Cases om

### Provokerede aborter, ukomplicerede forløb:

1. Henvises med uønsket graviditet GA 6+2, forundersøges og der aftales medicinsk abort. Tager Mifegyne samme dag og oplægger/indtager Cytotec dagen efter derhjemme. Opfølges med hCG. Sufficient fald – afsluttes.
2. Henvises med uønsket graviditet GA 6+2, forundersøges og der aftales medicinsk abort. Tager Mifegyne samme dag og oplægger/indtager Cytotec dagen efter derhjemme. Opfølges med fremmøde kontrol, hvor ultralyd viser tom uterus - afsluttes.
3. Henvises med uønsket graviditet GA 9+3, forundersøges og der aftales medicinsk abort. Tager Mifegyne samme dag og indlæggelse til Cytotec dagen efter. Opfølges med fremmøde kontrol, hvor ultralyd viser tom uterus - afsluttes.
4. Henvises med uønsket graviditet GA 9+3, forundersøges og der aftales kirurgisk abort. Der udleveres Cytotec. Møder til kirurgisk abort 2 dage efter, ingen opfølgende kontrol.

### Provokerede aborter, komplicerede forløb:

5. Henvises med uønsket graviditet GA 6+2, forundersøges og der aftales medicinsk abort. Tager Mifegyne samme dag og oplægger/indtager Cytotec dagen efter derhjemme. Opfølges med hCG. Ikke sufficient fald. Indkaldes til opfølgende UL-skanning. Der ses fortsat levende graviditet GA 8+2, sendes til EVAC samme dag. Ingen opfølgning.
6. Henvises med uønsket graviditet GA 6+2, forundersøges og der aftales medicinsk abort. Tager Mifegyne samme dag og oplægger/indtager Cytotec dagen efter derhjemme. Opfølges med hCG. Ikke sufficient fald. Indkaldes til opfølgende UL-skanning. Der ses fortsat levende graviditet, GA 8+2 ønsker på ny medicinsk behandling. Tager Mifegyne samme dag og indlæggelse til Cytotec dagen efter. Opfølgende kontrol ved ultralyd, som viser tom uterus - afsluttes.
7. Henvises 3 uger efter medicinsk abort med fortsat blødning. Ved skanning ses endometrium på 12 mm, ingen anledning til yderlig behandling. Afsluttes.
8. Henvises 3 uger efter medicinsk abort med fortsat blødning. Ved skanning ses endometrium på 25mm og retineret væv, bookes til EVAC dagen efter. Ingen opfølgende kontrol.
9. Henvises 3 uger efter medicinsk abort med fortsat blødning. Ved skanning ses endometrium på 25mm og retineret væv, ønsker behandling med Cytotec. Kontrol med ultralyd, der viser tom uterus. Afsluttes.
10. Henvises med uønsket graviditet GA6+2, forundersøges og der aftales medicinsk abort. Tager Mifegyne samme dag og oplægger/indtager Cytotec dagen efter derhjemme. Får aldrig taget kontrol hCG, trods flere henvendelser. Genhenvises 8 uger efter, hvor der ses fortsat levende graviditet med CRL sv.t. GA 14+2. Sendes til samråd. Bevilges. Møder en uge efter til medicinsk abort under indlæggelse. Kontrolleres med ultralyd, som viser tom uterus.
11. Henvises med uønsket graviditet GA 6+2, forundersøges og der aftales medicinsk abort. Tager Mifegyne samme dag og oplægger/indtager Cytotec dagen efter derhjemme. Får aldrig taget kontrol hCG, trods flere henvendelser. Genhenvises 8 uger efter, hvor UL viser fortsat levende graviditet med CRL sv.t. GA 14+2. Ønsker at bevare graviditeten.