



Nyt om obstetrisk kodning fra DSOG's kodeudvalg.

November 2021

Indhold

- Ændringer i ordlyd i eksisterende koder.
- Nye koder.
- Kommende ændringer i Resultatindberetning på mater og barn.
- Nye grænseværdier for gestationsalder i LPR-indberetning af aborter og fødsler.
- Kodning af sectio, UK, stimulation/ppmed, og sectio antea.
- Øvrigt nyt fra DSOG's kodeudvalg.

Ændring i ordlyd

- DO365 Graviditet med estimeret fostervægt mindre end forventet ved gestationsalder (**SGA**).
Ændret 1/10 2021.
- DO422 Vandafgang før 37. graviditetsuge **uden** regelmæssige veer (PPROM).
Ændres 1/1 2022.

Nye koder fra 1. oktober 2021

- **DZ358S Graviditet med tidligere fødsel med komplicerende blødning > 1000 mL**
- **DZ917 Anamnese med kvindelig omskæring (FGM)**
- Nye underkoder til DZ351 (Graviditet efter tidligere abort):
- **DZ351A Graviditet efter tidligere spontan senabort (GA 12+0 - 21+6)**
- **DZ351B Graviditet efter tidligere provokeret senabort (GA 12+0 - 21+6)**

Nye procedurekoder fra 1. oktober 2021

- ZZ4207 Podning for streptokokker, gruppe B
- ZZ4207A Podning for streptokokker, gruppe B (GBS) under fødsel

Nuværende Resultatindberetning (RI) på fødselskontakten

Mater

Obligatorisk

- Gestationsalder
- Paritet
- Antal levendefødte
- Antal dødfødte
- Tobaksforbrug under graviditet
- Højde og vægt før graviditet

Barn

Obligatorisk

- Fødselstidspunkt
- Gestationsalder
- Kuld
- Flernummer
- Fosterpræsentation
- Apgar 5
- Hovedomfang
- Abdominalomfang
- Placentavægt
- Fødselsvægt
- Fødselslængde
- Fødested

Frivillig

- pH fra navlesnorsarterie
- pH fra navlesnorsvene
- Base-excess fra navlesnorsarterie
- Base-excess fra navlesnorsvene
- Evt. hørescreening

Vi samarbejder med Sundhedsdatastyrelsen om at inkludere følgende i RI:

Mater

- **Blødningsmængde i mL ifm fødsel** (som på nuværende tidspunkt indberettes som bidiagnose DO720 og tillægskode VPHxxxx for eksakt blødningsmængde). Værdien bliver obligatorisk.
- **Intenderet fødested ved fødselens start** (på nuværende tidspunkt anvendes ZLJ* som tillægskode til fødselens aktionsdiagnose DO8*). Værdien bliver obligatorisk.
- **Dato og tidspunkt for vandafgang**. Bliver frivillig.
- **Dato og tidspunkt for veer start**. Bliver frivillig

Region Syddanmark er fra slut juni 2021 begyndt at indberette på de to nye resultattyper for hhv. intenderet fødested og blødningsmængde.

Forventet opstart for de øvrige regioner er november 2021 for Region H og Region Sjælland. 2022/2023 for Region Midtjylland og Region Nordjylland.

Vi samarbejder med Sundhedsdatastyrelsen om at inkludere følgende i RI:

Barn

- Faders cpr nr ved dødfødt barn.
- Ved dødfødt barn: oplysning om hvorvidt barnet døde før fødslen eller under fødslen.

Forventet opstart i november 2021 for Region H og Region Sjælland, og i 2022/2023 for de øvrige regioner.

OBS. Husk fortsat at sende dødfødselsblanket til SDS.

Fejl i indberetning af GA ved abort

Tabel 1 Spontane aborter og patologiske graviditeter fordelt på svangerskabs-
længde og region

	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Total
0-11 uger	3.334	6.352	5.854	12.324	3.636	31.500
12-14 uger	261	742	558	2.246	722	4.529
15-21 uger	157	205	170	809	184	1.525
22-45 uger	0	1	0	1.765	291	2.057
Uoplyst	481	436	1.682	280	64	2.943
TOTAL	4.233	7.736	8.264	17.424	4.897	42.554

Kilde: Landspatientregisteret pr. 27. maj 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Spontane aborter og patologiske graviditeter er i udtrækket afgrænset til alle kontakter i LPR3 med en aktionsdiagnose af typen DO00*-DO03*.

Fejl i indberetning af GA ved abort

Tabel 2 Tidlige provokerede aborter fordelt på svangerskabslængde og region

	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Total
0-11 uger	4.175	5.385	4.737	3.534	3.071	20.902
12-14 uger	0	4	0	15	1	20
15-21 uger	0	6	2	1	0	9
22-45 uger	0	2	0	282	54	338
Uoplyst	0	25	81	34	6	146
TOTAL	4.175	5.422	4.820	3.866	3.132	21.415

Kilde: Landspatientregisteret pr. 27. maj 2021, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Tidlige provokerede aborter er i udtrækket afgrænset til alle kontakter i LPR3 med en aktionsdiagnose af typen DO04* eller DO06*.

Fejl i indberetning af GA ved fødsler

Tabel 3 Fødselskontakter for moder fordelt på svangerskabslængde og region

	Region Nordjylland	Region Midtjylland	Region Syddanmark	Region Hovedstaden	Region Sjælland	Total
0-11 uger	0	59	1	0	0	60
12-14 uger	2	244	2	0	0	248
15-21 uger	5	23	20	40	16	104
22-45 uger	12.011	33.558	26.421	52.524	15.158	139.672
Uoplyst	0	12	34	21	1	68
TOTAL	12.018	33.896	26.478	52.585	15.175	140.152

Kilde: Landspatientregisteret pr. 27. maj 2021, Sundhedsdatastyrelsen


Note: Fødselskontakter for moder er i udtrækket afgrænset til alle kontakter i LPR3 med en aktionsdiagnose af typen DO80*-DO84*.

SDS har derfor (i samarbejde med DSOG) indført følgende GA grænser, gældende fra 1. juli 2021


Tabel 4 Intervaller for tilladte svangerskabslængder for fødsler og aborter

Kontakt	Diagnose	Svangerskabslængde i fulde uger
Spontan abort og patologisk graviditet	DO00*-DO03*	2-21
Tidlig provokeret abort	DO04*, DO06*	2-11
Sen provokeret abort (som aktionsdiagnose)	DO05* (som aktionsdiagnose)	12-21
Sen provokeret abort (som bidiagnose, herunder tilfælde af abortindgreb, som fører til fødsel)	DO05* (som bidiagnose)	12-45
Fødsel	DO80*-DO84*	15-45
Levendefødt barn	DZ389	15-45
Dødfødt barn	DP950	22-45

Husk fortsat at sectio kodes således:



Kodning af UK:



Situationer hvor der ikke skal angives bidiagnoser for UK (DO321 eller DO641) som indikation

Akut sectio før fødsel (KMCA10A), f.eks pga
præeklampsi eller blødning.

Elektivt sectio (KMCA10B), hvor indikationen er en
anden end UK, f.eks maternal request eller tidligere
sectio x 2.

Kodning af sectio antea

- **DZ358E Graviditet efter tidligere kejsersnit**
- **DO342 Graviditet med cicatrice i livmoderen efter tidligere indgreb**
- DO342 findes i ICD10, hvorimod DZ358E er en dansk kode.
- De to koder anvendes forskelligt på de respektive fødesteder.
- Vi anbefaler at man fortsætter vanlig kodepraksis, og at man altid har én af ovenstående diagnoser ved flergangsfødende med sectio antea.
Førstegangsfødende med cicatrice i uterus efter tidligere indgreb kodes med DO342.

Induktion/stimulation ved abort og fødsel. Samme regler:

- Igangsættelse/induktion **uden** veer og/eller vandafgang: BKHD2*, KMAC96A, KMAC00 (igangsættelse af fødsel) eller BKHD4* (induktion af abort).
Anvendes kun til den først anvendte metode. Eventuelle efterfølgende metoder (som led i ppmed) kodes med stimulation.
- Ved veer og/eller vandafgang og behandling med prostaglandin eller s-drop anvendes procedurekoder for **stimulation**: BKHD3* (stimulation ved fødsel) eller BKHD5* (stimulation ved abort).

Andet nyt

- Hold øje på DSOG's hjemmeside:
- Se kodevejledning for abort, udarbejdet af DSOG's gynækologiske kodeudvalg.
- **Opdateret version af den obstetriske kodevejledning bliver tilgængelig i starten af 2022.**
Heri:
Ny sektion om kodning af sene aborter.
Ny sektion om kodning af nyfødte.
- Se også indberetningsvejledningen til LPR3 fra SDS:
<https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-patientregistrering/indberetning-lpr3>