

Registrering af abort og tidl. graviditetskomplikationer – EPJ

Generelt

I ambulat kontakt forud for kir. abort vælges A-diagnosen DZ322 "Undersøgelse forud for provokeret abort".

Når Mifegyne og/eller Cytotec udleveres skal dette procedurekodes.

Ved provokeret abort anvendes GA (fastsat ved UL) svarende til den dag aborten opstartes medicinsk, eller udføres kirurgisk. Ved missed abortion eller spontane aborter kodes GA (ud fra SM) svarende til den dag, hvor man konstaterer at fosteret er gået til.

Eventuelle komplikationer (DO08*-koder) registreres som B-diagnoser.

Ved ny patientkontakt pga. komplikation i efterforløbet anvendes komplikationsdiagnose DO08* som A-diagnose.

Hvis pt efterfølgende kommer til ambulant kontrol, eller der er telefonisk kontakt med pt (fx til HCG-svar) anvendes koden DZ098C "Kontrolundersøgelse efter abort IKA".

Kriterier og anvendelse

Provokeret abort før 12 uger

Diagnose

DO049	Provokeret abort før 12 graviditetsuger UNS
-------	---

Ydelser

BKHD42	Medicinsk induceret tidlig abort med antiprogesteron og prostaglandin	Mifegyne + Cytotec
KLCH03	Provokeret abort ved vakuumaspiration	
KLCH00	Provokeret abort ved curettage	

Missed abortion

Diagnoser

DO020	Graviditet uden erkendt foster (blighted ovum)	
DO021	Graviditet med dødt retineret foster (missed abortion)	Ved minimal blødning (ellers DO03*)

Ydelser

BKHD52	Behandling med antiprogesteron og prostaglandin	Mifegyne + Cytotec
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	

Ekstrauterin graviditet

Diagnose

DO009	Ektopisk graviditet UNS.	For specificerede koder DO00*- DO009 se SKS-browseren
-------	--------------------------	---

Ydelser

KLBE01	Laparoskopisk enkeltsidig salpingektomi	Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
KLBE00	Enkeltsidig salpingektomi	Åbent indgreb. Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
KLBC21	Laparoskopisk fjernelse af tubagraviditet med tubotomi	Salpinxbevarende Husk tillægskode for angivelse af side: højre tul1, venstre tul2
BKHE8A	Behandling med methotrexat ved ekstrauterin graviditet eller mola	

Spontan abort

Ved sene spontane aborter efter 16 uger skal tilføjes en B-diagnose, om hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret.

Diagnoser

DO200	Truende abort	Ved vandafgang, blødning eller smerter, hvor fosteret stadig er i live
DO030	Inkomplet spontan abort kompliceret med underlivsinfektion	
DO031	Inkomplet spontan abort kompliceret med sen eller excessiv blødning	Ved medicinsk eller kirurgisk behandling.
DO034	Inkomplet spontan abort uden komplikation	
DO039	Komplet eller ikke specificeret spontan abort uden komplikation	Denne kode anvendes hvis ingen medicinsk el kirurgisk behandling.

Ydelser

BKHD50	Behandling efter abort, inkl. missed abortion med prostaglandin	Cytotec
BKHD52	Behandling efter abort, inkl. missed abortion med antiprogesteron og prostaglandin	Mifegyne + Cytotec
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	

PUL (Pregnancy with unknown location)		
Diagnoser		
DZ321L	Bekræftet graviditet med ukendt lokalisation (PUL)	DZ321L anvendes indtil pt afsluttes (se nedenfor)
DO009	Ektopisk graviditet UNS.	Når HCG er faldet sufficient og pt afsluttes, redigeres DZ321L til DO039 eller DO009, alt efter hvad der er mest sandsynligt. Diagnosen "løses". GA og dato for udfald registreres i obst. historik
DO039	Komplet eller ikke specificeret spontan abort uden komplikation	
DO022	Afsluttet graviditet med ukendt lokalisation (PUL)	Anvendes KUN hvis det ved afslutning af pt ikke er muligt at differentiere mellem DO009 og DO039
Mola		
Diagnoser		
DZ038O	Observation pga. mistanke om sygdom i forbindelse med graviditet, fødsel eller barsel.	Der registreres med tillægskode DO019 Mola UNS indtil mik svar
DO010	Komplet mola	Husk cancerregistrering
DO011	Inkomplet mola	Husk cancerregistrering
Provokerede sene aborter		
Ved ab pro fra 12+0 skal tilføjes baggrund for samrådsabort, og hvorvidt der var mistanke om misdannelser hos fosteret. Dette registreres som B-diagnose til abort-A-diagnosen. Hvis misdannelser eller mistanke om misdannelser, er relevant er DQ*- diagnose obligatorisk.		
OBS Ved abort, hvor fosteret kvitteres > GA 21+6, eller hvor fosteret viser livstegn (uanset GA), kræves fuld fødselsindberetning. Der registreres med DO836 eller DO846 som A-diagnose, samt abortkode DO050 eller DO059 som B-diagnose.		
Diagnoser		
DO050	Provokeret abort efter udgangen af 12. graviditetsuge uden samrådstilladelse ved fare for kvindens liv eller helbred	
DO059	Provokeret abort efter udgangen af 12. graviditetsuge med samrådstilladelse	
Ydelser		
BKHD46	Medicinsk induceret abort med antiprogesteron og prostaglandin efter 12 graviditetsuger	Mifegyne+Cytotec
BKHD44	Medicinsk induceret abort med antiprogesteron efter 12 graviditetsuger	Mifegyne
BKHD45	Medicinsk induceret abort med prostaglandin efter 12 graviditetsuger	Cytotec
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	Ved retineret væv/placenta
Andre ydelser (relevant ved alle typer abort)		
KLWW00	Re-evakuering af livmoder efter provokeret abort	Efter tidl. kirurgisk abort
KMWW00	Re-evacuatio uteri efter fødsel eller spontan abort	Efter tidl. EVAC pga. spontan abort
KMBA00	Vakuumaspiration efter fødsel eller abort	Efter medicinsk abort eller spontan abort
KMBA03	Udskrabning efter fødsel eller abort	Med curette
NAAD0B	Epidural blokade til smertelindring	
NAAC	Generel anæstesi	
BPMD01C	Rhesusprofylakse efter afsluttet graviditet	
BJCZ00	Indlæggelse af spiral med kobber	
BJCZ01	Indlæggelse af spiral med hormon	
Øvrige diagnoser		
DO081G	Blødning efter abort	Som indikation for EVAC eller medicinsk behandling
DO079	Fortsat levende graviditet efter forsøg på provokeret abort	Ved fortsat levende graviditet
DO088L	Retineret væv efter abort	
DO209	Blødning tidligt i graviditeten UNS	Ved GA < 22+0
DZ321C	Intrauterin graviditet bekræftet ved ultralyd	
Ambulant efterforløb (uanset abort-type)		
Diagnose		
DZ098C	Kontrolundersøgelse efter abort IKA	