

## Vejledning til kodning af COVID-19 i graviditet

### Kodning af gravide med mulig eller bekræftet infektion med COVID-19

Da teststrategien er blevet ændret over tid, specificeres her kodning på det obstetriske område.

Vi anbefaler ikke anvendelse af specifikke ydelseskoder, feks isolation (BPXB1), podning (ZZ7098) mv.

I obstetrikken anvendes disse to diagnoser:

		om infektion, og/eller isolation/karantæne.
DB342A	COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation	Ved positiv podning/antistof-test, hvor formodes at infektion har været i akt grav. Husk DO985 som <u>bidagnose</u> .

### DZ038PA1 Observation pga. mistanke om COVID-19-infektion

Hvis pt henvender sig (telefonisk eller i ambulant kontakt) i graviditeten og beskriver symptomer på covid-19 kan denne kontakt kodes med DZ038PA1.

Hvis pt testes negativ for coronavirus registreres ikke noget på en senere fødselskontakt.

Der kodes **kun** med DZ038PA1 på fødselskontakten hvis der under indlæggelsen ifm fødslen mistænkes infektion med covid-19 (uanset om dette be- eller afkræftes)

### DB342A COVID-19-infektion uden angivelse af lokalisation

Hvis kvinden er fundet positiv ved podning og/eller antistof-test i løbet af graviditet, fødsel eller barsel kodes med DB342A på fødselskontakten. Dette også selvom infektionen er overstået i graviditeten, ud fra betragtningen at infektion med covid-19 har kompliceret graviditeten.

Ved bekræftet infektion gives besked til den/de personer i afdelingen der indberetter til studie om covid-19.

### Screening af barnefader/partner

Hvis man finder det nødvendigt (eller det patientadministrative system kræver det) at kode at manden/ledsageren podes for coronavirus kan disse to koder anvendes:

Diagnose: DZ769 Person i kontakt med sundhedsvæsenet af årsag UNS.

Ydelse: ZZ7098 Podning fra svælg.